	薬品名	作用	相談・使用禁止・禁忌	副作用
高		コレステロールと結合してコレス		
⊐	リノール酸ポリエンホスファチジルコリン	テロールエステルを形成し、肝臓		  吐き気・胸やけ・下痢
レ	リノ ル酸ホリエンホハノリリンルコリン	におけるコレステロール代謝を促		
ス		進		
テ	ソイステロール (大豆油不けん化物)	腸管におけるコレステロールの吸収を抑える		吐き気・胸やけ・下痢
I		LDLなどの異化排泄を促進し		
ル	パンテチン	リポ蛋白リパーゼ活性を高めて		吐き気・胸やけ・下痢
改		HDL産生高める		
善	ウルソデオキシコール酸	<mark>胆汁</mark> の分泌促進して消化を助ける	妊婦・肝臓病(相談)	
血液循環	ルチン	ビタミン様物質の一種		
		高血圧などにおける毛細血管の補		
		強・強化		
	ユビデカレノン (コエンザイムO10)	ビタミンBとともに働く。	15歳未満 <b>×</b> 、強心薬併用 <b>×</b>	胃部不快感・食欲減退・吐き気・下痢 発疹・かゆみ
		心筋の酸素利用効率を高めて収縮	(相談)高血圧、呼吸器、腎臓病、甲状腺、貧	
		を高め、血液循環を改善	血	
		ビタミンEと併用して使用		
		遊離したニコチン酸の働きによ		
		り、末梢の血液循環を改善		

 $\underline{\text{(https://azmam-ns-2025.sumomo.ne.jp/)}} \leftarrow \text{A's} \quad \underline{\text{mam}}$